

STRUCTURES DE MONGE-AMPÈRE SYMPLECTIQUES NON DÉGÉNÉRÉES EN DIMENSION 6

BERTRAND BANOS

RÉSUMÉ. We define a non-degenerated Monge-Ampère structure on a 6-manifold associated with a Monge-Ampère equation as a couple (Ω, ω) , such that Ω is a symplectic form and ω is a 3-differential form which satisfies $\omega \wedge \Omega = 0$ and which is non-degenerated in the sense of Hitchin. We associate with such a couple an almost (pseudo) Calabi-Yau structure and we study its integrability from the point of view of Monge-Ampère operators theory. The result we prove appears as an analogue of Lychagin and Roubtsov theorem on integrability of the almost complex or almost product structure associated with an elliptic or hyperbolic Monge-Ampère equation in the dimension 4. We study from this point of view the example of the Stenzel metric on T^*S^3 .

1. INTRODUCTION

Une équation de Monge-Ampère est une équation différentielle du second ordre non linéaire, dont la non-linéarité est très spécifique : c'est celle du déterminant. Par exemple en deux variables, une équation de Monge-Ampère s'écrit

$$(1) \quad A \frac{\partial^2 f}{\partial q_1^2} + 2B \frac{\partial^2 f}{\partial q_1 \partial q_2} + C \frac{\partial^2 f}{\partial q_2^2} + D \left(\frac{\partial^2 f}{\partial q_1^2} \frac{\partial^2 f}{\partial q_2^2} - \left(\frac{\partial^2 f}{\partial q_1 \partial q_2} \right)^2 \right) + E = 0,$$

où A, B, C, D et E sont des fonctions lisses sur l'espace des jets $J^1\mathbb{R}^2$, i.e. sont fonctions de $(q, f(q), \frac{\partial f}{\partial q})$. Lorsque A, B, C, D et E sont fonctions uniquement de $(q, \frac{\partial f}{\partial q})$ (i.e. sont des fonctions sur l'espace cotangent $T^*\mathbb{R}^2$), on parle d'équation de Monge-Ampère symplectique.

La théorie géométrique des opérateurs de Monge-Ampère développée dans les années 70 par Lychagin ([L]), associe aux équations de Monge-Ampère symplectiques sur une variété M^n de dimension n un couple de formes différentielles (Ω, ω) sur le fibré cotangent T^*M , Ω étant la forme symplectique sur T^*M et $\omega \in \Omega^n(T^*M)$ étant effective i.e. $\omega \wedge \Omega = 0$. Plus précisément, l'équation de Monge-Ampère associée à un tel couple (Ω, ω) est l'équation différentielle

$$(2) \quad (df)^*(\omega) = 0,$$

où $df : M \rightarrow T^*M$ est la section naturelle associée à une fonction lisse f sur M . Ainsi, par exemple, à l'équation (1) est associée la forme symplectique canonique sur $T^*\mathbb{R}^2$

$$\Omega = dq_1 \wedge dp_1 + dq_2 \wedge dp_2,$$

et la forme différentielle

$$\begin{aligned} \omega = & Adp_1 \wedge dq_2 + B(dq_1 \wedge dp_1 - dq_2 \wedge dp_2) + Cdq_1 \wedge dp_2 \\ & + Ddp_1 \wedge dp_2 + Edq_1 \wedge dq_2. \end{aligned}$$

Une solution généralisée de l'équation de Monge-Ampère (2) est une sous variété lagrangienne de (T^*M, Ω) sur laquelle s'annule notre forme ω . Remarquons que si une solution généralisée se projette difféomorphiquement sur la base M alors cette

solution est localement le graphe d'une section $df : M \rightarrow T^*M$ avec f solution explicite de (2).

Généralisant cette notion, nous appelons structure de Monge-Ampère (symplectique) sur une variété X^{2n} de dimension $2n$ la donnée d'un couple (Ω, ω) , Ω étant une forme symplectique sur X et $\omega \in \Omega^n(X)$ étant une forme différentielle effective sur (X, Ω) . En dimension $n = 2$, lorsque la 2-forme ω est non dégénérée (i.e. le pfaffien $pf(\omega) = \frac{\omega \wedge \omega}{\Omega \wedge \Omega}$ est non nul), le couple (Ω, ω) définit une section $A_\omega : X \rightarrow TX \otimes T^*X$ qui est soit une structure presque complexe ($A_\omega^2 = -Id$) lorsque $pf(\omega) > 0$, soit une structure presque produit ($A_\omega^2 = Id$) lorsque $pf(\omega) < 0$:

$$\frac{\omega}{\sqrt{|pf(\omega)|}} = \Omega(A_\omega, \cdot).$$

Lychagin et Roubtsov ([LR1]) ont montré la

PROPOSITION 1.1. *La structure presque complexe ou presque produit A_ω est intégrable si et seulement si*

$$d\left(\frac{\omega}{\sqrt{|pf(\omega)|}}\right) = 0.$$

Dans le langage des équations différentielles, c'est à dire du point de vue local, ce résultat s'énonce

PROPOSITION 1.2. *Une équation de Monge-Ampère $\Delta_\omega = 0$ sur $\mathbb{R}^2$ associée à une forme effective non dégénérée ω peut être ramenée par un changement de variable symplectique à l'une des deux équations*

$$\begin{cases} \Delta f = 0 & (pf(\omega) > 0) \\ \square f = 0 & (pf(\omega) < 0) \end{cases}$$

si et seulement si

$$d\left(\frac{\omega}{\sqrt{|pf(\omega)|}}\right) = 0.$$

Pour classifier les équations de Monge-Ampère à coefficients constants en dimension 3, Lychagin et Roubtsov ont introduit un invariant quadratique q_ω associé à chaque 3-forme effective ω ([LR3]). Hitchin, en étudiant les structures de Calabi-Yau en dimension complexe 3, a défini un invariant linéaire K_ω ([Hi]) pour toutes les 3-formes. Nous montrons ici que ces deux invariants coïncident lorsque l'on se restreint aux formes effectives. (Proposition 3.8). Cette remarque nous permet de concilier les travaux de Lychagin, Roubtsov et Hitchin pour démontrer des résultats analogues à 1.1 et 1.2 en dimension 3. Précisons ici quelques notations. Nous supposons que notre 3-forme effective ω est non dégénérée au sens de Hitchin. Hitchin a défini un invariant scalaire $\lambda(\omega)$ que nous appellerons pfaffien de Hitchin et qui est alors non nul. Il a de plus montré que ω s'écrit comme la somme de deux formes complexes décomposables, uniquement déterminées à ordre près : $\omega = \alpha + \beta$, et que cette décomposition permet d'associer une forme duale $\hat{\omega}$ à ω . Nous associons au couple $(\Omega, \omega) \in \Omega^2(X^6) \times \Omega^3(X^6)$ une structure géométrique que nous appelons structure presque (pseudo) Calabi-Yau. Cette structure est essentiellement la donnée d'une métrique q_ω (éventuellement indéfinie), d'une structure presque complexe ou presque produit K_ω compatible avec q_ω et Ω et de deux formes différentielles de degré 3 décomposables dont les distributions associées sont les distributions des vecteurs propres de K_ω . Nous étendons les résultats de [Hi] pour montrer l'analogue de 1.1 :

PROPOSITION 1.3. *La structure presque (pseudo) Calabi-Yau $(q_\omega, K_\omega, \Omega, \alpha, \beta)$ est “intégrable” si et seulement si*

$$\begin{cases} d(\frac{\omega}{\sqrt[4]{|\lambda(\omega)|}}) = 0 \\ d(\frac{\hat{\omega}}{\sqrt[4]{|\lambda(\omega)|}}) = 0 \end{cases}$$

Nous montrons alors la version locale de cette proposition :

THEOREME. 4.13 *Une équation de Monge-Ampère symplectique en dimension 3 associée à une structure de Monge-Ampère non dégénérée (Ω, ω) peut être ramenée par un changement de variables symplectique à l’une des équations suivantes*

$$\begin{cases} \text{hess}(f) = \gamma, & \gamma \neq 0 \\ \Delta f - \gamma \text{hess}(f) = 0, & \gamma \neq 0 \\ \square f + \gamma \text{hess}(f) = 0, & \gamma \neq 0 \end{cases}$$

si et seulement si

$$\begin{cases} d(\frac{\omega}{\sqrt[4]{|\lambda(\omega)|}}) = 0 \\ d(\frac{\hat{\omega}}{\sqrt[4]{|\lambda(\omega)|}}) = 0 \\ q_\omega \text{ est plate} \end{cases}$$

La motivation de cette article est de généraliser en dimension 3 la notion de “sous variété spéciale lagrangienne”. Ces sous-variétés ont été introduites dans les années 80 par Harvey et Lawson dans leur célèbre article [HL]. Initialement, ils recherchaient des exemples de sous variétés minimales. Rappelons qu’une p -calibration sur une variété riemannienne (Y, g) est une p -forme fermée $\phi \in \Omega^p(Y)$ telle que en tout point y de Y

$$|\phi_y(e_1, \dots, e_p)| \leq 1,$$

pour toute famille orthonormée $(e_1, \dots, e_p)$ de $T_y Y$. Une sous-variété orientée L de Y de dimension p est dite ϕ -calibrée si $\phi_y(\theta_{L,y}) = 1$ pour tout $y \in L$, où $\theta_{L,y}$ est la forme volume sur $T_y L$ définie par la métrique g et l’orientation choisie sur L . Les sous-variétés ϕ -calibrées sont alors de volume minimal dans leur classe d’homologie. La forme $Re(\alpha)$ est un exemple de calibration sur $\mathbb{C}^n$ avec $\alpha = dz_1 \wedge \dots \wedge dz_n$ et les sous-variétés spéciales lagrangiennes sont les sous variétés $Re(\alpha)$ -calibrées. Cette notion de calibration spéciale lagrangienne se généralise sur les variétés de Calabi-Yau, i.e. sur les variétés de Kähler (Y, g, I, Ω) de dimension complexe n munies d’une forme volume holomorphe α telle que $\frac{\alpha \wedge \bar{\alpha}}{\Omega^n}$ soit une fonction constante non nulle. Comme l’explique M. Audin dans son cours *Lagrangian submanifold* ([A]), nous avons pu assister ces dernières années à un net regain d’intérêt pour ces sous variétés calibrées après les travaux de Strominger, Yau et Zaslow en “théorie miroir” ([SYZ]) et notamment leur construction d’une variété “miroir” d’une variété de Calabi-Yau de dimension complexe 3 à partir d’une fibration torique spéciale lagrangienne.

En 1990, Gromov (dans une discussion avec Roubtsov) avait noté que les structures de Monge-Ampère sont, en un certain sens, l’équivalent symplectique des calibrations : les calibrations correspondent aux formes effectives et les sous variétés calibrées correspondent aux sous variétés lagrangiennes. Les sous-variétés spéciales lagrangiennes se trouvent à l’intersection des deux approches. Harvey et Lawson ont en effet montré, que les sous-variétés spéciales lagrangiennes de $\mathbb{C}^n$ sont, à choix d’orientation près, les solutions généralisées de l’équation différentielle associée à la structure de Monge-Ampère (Ω, ω) avec

$$\begin{cases} \Omega = \frac{i}{2}(dz_1 \wedge d\bar{z}_1 + \dots + dz_n \wedge d\bar{z}_n) \\ \omega = Im(dz_1 \wedge \dots \wedge dz_n) \end{cases}$$

Cette équation s'écrit en dimension 3

$$(3) \quad \Delta f - \text{hess}(f) = 0.$$

Nous voulons montrer ici comment l'on peut construire des structures géométriques, analogues du point de vue symplectique aux structures de Calabi-Yau classiques, à partir d'équations différentielles semblables à (3).

Dans une première partie, nous rappelons l'approche géométrique de Lychagin des équations de Monge-Ampère à partir des formes différentielles effectives. Nous illustrons cette approche sur un exemple issu du modèle "semi-géostrophique" : les équations de Chynoweth-Sewell. Nous remarquons que ces équations sont symplectiquement équivalentes à l'équation de Monge-Ampère classique $\text{hess}(f) = 1$ en trois variables et nous donnons une solution explicite relativement "générique" de cette équation. Dans une deuxième partie nous adaptons les travaux de Hitchin sur la géométrie des 3-formes différentielles pour les formes effectives. Enfin, dans une troisième partie, nous définissons les structures presque Calabi-Yau associées aux structures de Monge-Ampère, nous étudions leur intégrabilité et nous montrons le théorème 4.13. Nous étudions comme exemple de métrique de Calabi-Yau non plate, la métrique de Stenzel sur T^*S^3 .

Cet article constitue une partie de la thèse de l'auteur préparée à l'université d'Angers. Je voudrais remercier mon directeur de thèse V. Roubtsov pour m'avoir suggéré et expliquer ce problème et pour les très enrichissantes discussions que nous avons pu avoir. Je remercie mon collègue Oleg Lisovyy pour toute l'aide qu'il m'a apportée, notamment dans la construction d'une solution explicite des équations de Chynoweth-Sewell. Je voudrais aussi remercier le Professeur B. Enriquez pour toutes ses remarques et suggestions.

2. FORMES EFFECTIVES ET STRUCTURES DE MONGE-AMPÈRE

Soit (V, Ω) un espace vectoriel symplectique réel de dimension $2n$. Soit $\Gamma : V \rightarrow V^*$ l'isomorphisme induit par Ω et $X_\Omega \in \Lambda^2(V^*)$ l'unique bivecteur tel que $\Gamma^*(X_\Omega) = \Omega$, $\Gamma^* : \Lambda^k(V) \rightarrow \Lambda^k(V^*)$ étant la puissance extérieure de Γ ¹.

Suivant les notations de ([L]), nous introduisons les opérateurs $\perp : \Lambda^k(V^*) \rightarrow \Lambda^{k-2}(V^*)$ $\omega \mapsto i_{X_\Omega}(\omega)$ et $\top : \Lambda^k(V^*) \rightarrow \Lambda^{k+2}(V^*)$, $\omega \mapsto \omega \wedge \Omega$. Ces opérateurs vérifient :

$$\begin{cases} [\perp, \top](\omega) = (n - k)\omega, \forall \omega \in \Lambda^k(V^*); \\ \perp : \Lambda^k(V^*) \rightarrow \Lambda^{k-2}(V^*) \text{ est injective pour } k \geq n + 1; \\ \top : \Lambda^k(V^*) \rightarrow \Lambda^{k+2}(V^*) \text{ est injective pour } k \leq n - 1. \end{cases}$$

Une k -forme ω est dite effective si $\perp \omega = 0$. Nous noterons $\Lambda_{\varepsilon}^k(V^*)$ l'espace des k -formes effectives. Si $k = n$, ω est effective si et seulement si $\omega \wedge \Omega = 0$.

Le théorème suivant explique le rôle fondamental joué par les formes effectives dans la théorie des opérateurs de Monge-Ampère ([L]) :

THEOREME 2.1 (Hodge-Lepage-Lychagin). *1. Toute forme $\omega \in \Lambda^k(V^*)$ peut être décomposée de façon unique en une somme finie*

$$\Omega = \omega_0 + \top \omega_1 + \top^2 \omega_2 + \dots,$$

les formes ω_i étant toutes effectives.

2. Si deux k -formes effectives s'annulent sur les même sous espaces isotropes de dimensions k de (V, Ω) alors elles sont proportionnelles.

¹on note par $\Lambda^*(V^*)$ l'espace des formes extérieures sur un espace vectoriel V et $\Omega^*(X)$ l'espace des formes différentielles sur une variété lisse X

Soit M^n une variété lisse de dimension n . Notons J^1M le fibré des 1-jets des fonctions lisses sur M et notons $j^1(f) : M \rightarrow J^1M$, $x \mapsto [f]_x^1$ la section naturelle associée à une fonction lisse f . L'opérateur de Monge-Ampère $\Delta_\omega : C^\infty(M) \rightarrow \Omega^n(M)$ associé à une forme $\omega \in \Omega^n(J^1M)$ est défini par

$$\Delta_\omega(f) = j^1(f)^*(\omega).$$

Soit U la forme de contact sur J^1M et X_1 le champ de Reeb. Une solution généralisée de l'équation de Monge-Ampère $\Delta_\omega = 0$ est une sous variété legendrienne L^n de (J^1M, U) sur laquelle s'annule ω . Si L se projette difféomorphiquement sur M alors L est localement le graphe d'une section $j^1(f)$, f étant une solution de l'équation différentielle $\Delta_\omega(f) = 0$. Soit la distribution de contact $x \in J^1M \mapsto C(x) = \text{Ker}(U_x)$. Remarquons que $(C(x), dU_x)$ est un espace vectoriel symplectique de dimension $2n$ et que

$$T_x J^1M = C(x) \oplus X_{1x}.$$

De plus, si L est une sous variété legendrienne alors $T_x L$ est un sous espace lagrangien de $(C(x), dU_x)$.

Soit $\Omega^*(C^*)$ l'espace des formes s'annulant le long de X_1 . En tout point x , l'espace vectoriel $(\Omega^*(C^*))_x$ s'identifie naturellement avec $\Omega^*(C(x)^*)$. Nous noterons $\Omega_\varepsilon^*(C^*)$ l'espace des formes effectives sur $(C(x), dU_x)$ en tout point x de J^1M . D'après la première partie du théorème 2.1, on a

$$\Omega_\varepsilon^*(C^*) = \Omega^*(J^1M)/I_C,$$

I_C étant l'idéal de Cartan engendré par U et dU . La seconde partie dit que si deux formes différentielles ω et θ sur J^1M déterminent le même opérateur de Monge-Ampère alors $\omega - \theta \in I_C$.

Le pseudo-groupe des difféomorphismes de contacts sur J^1M agit sur ces opérateurs comme suit

$$F(\Delta_\omega) = \Delta_{F^*\omega},$$

et l'action infinitésimale associée est

$$X(\Delta_\omega) = \Delta_{L_X(\omega)}.$$

Nous nous intéresserons ici à une classe plus restrictive d'opérateurs, celles des opérateurs symplectiques, i.e. la classe des opérateurs qui vérifient

$$X_1(\Delta_\omega) = \Delta_{L_{X_1}(\omega)} = 0.$$

Ces opérateurs correspondent aux équations de Monge-Ampère $\Sigma = \Sigma(x, \frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}) \subset J^2M$ ne dépendant que des dérivées partielles du premier et du deuxième ordre de f . Soit (T^*M, Ω) le fibré cotangent de M muni de sa forme symplectique naturelle et considérons la projection $\beta : J^1M \rightarrow T^*M$ définie par le diagramme commutatif suivant :

$$\begin{array}{ccccc} \mathbb{R} & \xleftarrow{\alpha} & J^1M & \xrightarrow{\beta} & T^*M \\ & \nwarrow f & \uparrow j^1(f) & \nearrow df & \\ & & M & & \end{array}$$

En utilisant β , on peut naturellement identifier l'espace $\{\omega \in \Omega_\varepsilon^*(C^*) : L_{X_1}\omega = 0\}$ avec l'espace des formes effectives sur (T^*M, Ω) . L'action du groupe de contact sur les opérateurs symplectiques est alors restreinte à l'action du groupe symplectique sur T^*M .

DEFINITION 2.2. Une structure de Monge-Ampère symplectique sur une variété X^{2n} de dimension $2n$ est la donnée d'un couple (Ω, ω) , où $\Omega \in \Omega^2(X)$ est une forme symplectique sur X et $\omega \in \Omega^n(X)$ est une forme différentielle vérifiant

$$\Omega \wedge \omega = 0$$

Remarquons que, d'après le théorème de Darboux, (X^{2n}, Ω) s'identifie localement avec $(T^*\mathbb{R}^n, \Omega_0)$. Au couple (Ω, ω) est alors associée l'équation de Monge-Ampère (symplectique) sur $\mathbb{R}^n$, $\Delta_\omega = 0$. Et réciproquement à toute équation de Monge-Ampère (symplectique) $\Delta_\omega = 0$ sur une variété M est associée une classe conforme de structures de Monge-Ampère (symplectiques) (Ω, ω) sur T^*M .

EXEMPLE 2.3. Un exemple d'équation de Monge-Ampère à coefficients constant est celui des équations de Chynoweth-Sewell ([CS]) issues du "modèle semi-géostrophique" :

$$(4) \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} - \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \right)^2 + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} = \gamma, \quad \gamma \in \mathbb{R}$$

L'équation initiale de Chynoweth-Sewell correspond au cas $\gamma = 0$. Remarquons que si $F(x, y)$ est une solution de $\text{hess}(F) = 1$ alors $F(x, y) - \frac{1}{2}z^2$ est une solution de l'équation de Chynoweth-Sewell. Ainsi, par exemple

$$\frac{1}{3} \sqrt{(x^2 + 2y)^3} - \frac{1}{2}z^2$$

est une de solution régulière de (4) quand $\gamma = 0$.

La forme effective associée à (4) s'écrit dans le système de coordonnées symplectique (x, y, z, p, q, h) de $T^*\mathbb{R}^3$,

$$\omega = dp \wedge dq \wedge dz + dx \wedge dy \wedge dh - \gamma dx \wedge dy \wedge dz.$$

ω est clairement la somme de deux formes décomposables :

$$\omega = dp \wedge dq \wedge dz + dx \wedge dy \wedge (dh - \gamma dz)$$

Soit alors le changement de variable symplectique

$$\phi(x, y, z, p, q, h) = (x, y, h, p, q, \gamma h - z).$$

L'image par ϕ de ω est

$$\phi^*(\omega) = dp \wedge dq \wedge dh - dx \wedge dy \wedge dz.$$

Autrement dit, les équations de Chynoweth-Sewell se rapportent toutes à l'équation de Monge-Ampère classique

$$(5) \quad \text{hess}(f) = 1$$

Lorsque n est impair, un exemple de solution régulière de $\text{hess}(f) = 1$ est

$$f(x_1, \dots, x_n) = 2 \int_a^{\sqrt{\sum_{i < j} x_i x_j}} \left(b + \frac{\xi^n}{n-1} \right)^{\frac{1}{n}} d\xi,$$

où a et b sont des constantes. En particulier pour $n = 3$,

$$f(x, y, z) = \int_a^{\sqrt{xy + yz + zx}} (b + 4\xi^3)^{1/3} d\xi,$$

est une solution régulière de (5). Dès lors un exemple de solution généralisée de (4) est

$$L = \{(x, y, (x+y)\alpha, (y+z)\alpha, (z+x)\alpha, \gamma(x+y)\alpha - z)\},$$

avec

$$\alpha = \frac{1}{2} \left(\frac{b}{(xy + yz + zx)^{\frac{3}{2}}} + 4 \right)^{\frac{1}{3}}$$

3. GÉOMÉTRIE DES 3-FORMES EFFECTIVES EN DIMENSION 6

3.1. Action de $SL(6, \mathbb{R})$ sur $\Lambda^3(\mathbb{R}^6)$.

Nous rappelons ici brièvement les résultats de Hitchin sur la géométrie des 3-formes extérieures en dimension 6 ([Hi]). Soit V un espace vectoriel réel de dimension 6 et $\Lambda^k(V^*)$ l'espace des k -formes extérieures sur V . Fixons $\theta \in \Lambda^6(V^*)$ une forme volume sur V . Notons $A : \Lambda^5(V^*) \rightarrow V \otimes \Lambda^6(V^*)$ l'isomorphisme induit par le produit extérieur et soit pour $\omega \in \Lambda^3(V^*)$ l'endomorphisme $K_\omega : V \rightarrow V$ défini par

$$K_\omega(X)\theta = A(i_X\omega \wedge \omega).$$

DEFINITION 3.1. *Le pfaffien de Hitchin d'une 3-forme $\omega \in \Lambda^3(V^*)$ est*

$$\lambda_\theta(\omega) = \frac{1}{6} \text{Tr}(K_\omega^2).$$

Une 3-forme ω est dite non dégénérée si et seulement si $\lambda_\theta(\omega)$ est non nul.

PROPOSITION 3.2 (Hitchin). *Soit $\omega \in \Lambda^3(V^*)$ de pfaffien $\lambda_\theta(\omega)$ non nul.*

1. $K_\omega^2 = \lambda_\theta(\omega) \text{Id}$.
2. $\lambda_\theta(\omega) > 0$ si et seulement si $\omega = \alpha + \beta$ où α et β sont des formes réelles décomposables sur V . De plus si on impose $\frac{\alpha \wedge \beta}{\theta} > 0$ alors α et β sont uniquement déterminées :

$$\begin{cases} 2\alpha = \omega + |\lambda_\theta(\omega)|^{-\frac{3}{2}} K_\omega^*(\omega) \\ 2\beta = \omega - |\lambda_\theta(\omega)|^{-\frac{3}{2}} K_\omega^*(\omega) \end{cases}$$

3. $\lambda_\theta(\omega) < 0$ si et seulement si $\omega = \alpha + \bar{\alpha}$ où $\alpha \in \Lambda^3(V^* \otimes \mathbb{C})$ est une forme complexe décomposable sur V . Si l'on impose de plus que $\frac{\alpha \wedge \bar{\alpha}}{i\theta} > 0$ alors α est uniquement déterminée :

$$\alpha = \omega + i|\lambda_\theta(\omega)|^{-\frac{3}{2}} K_\omega^*(\omega).$$

REMARQUE 3.3. *Fixons une base $(e_1, \dots, e_6)$ de V et notons $(e_1^*, \dots, e_6^*)$ sa base duale.*

1. $\lambda_\theta(\omega) > 0$ si et seulement si ω est dans la $GL(V)$ -orbite de

$$e_1^* \wedge e_2^* \wedge e_3^* + e_4^* \wedge e_5^* \wedge e_6^*.$$

2. $\lambda_\theta(\omega) < 0$ si et seulement si ω est dans la $GL(V)$ -orbite de

$$(e_1^* + ie_4^*) \wedge (e_2^* + ie_5^*) \wedge (e_3^* + ie_6^*) + (e_1^* - ie_4^*) \wedge (e_2^* - ie_5^*) \wedge (e_3^* - ie_6^*).$$

L'action de $GL(V)$ sur $\Lambda^3(V^)$ à ainsi deux orbites ouvertes séparées par l'hyper-surface $\lambda_\theta = 0$. Ceci justifie la terminologie de "3-forme non dégénérée en dimension 6".*

L'unicité de la décomposition en somme de deux formes décomposables (à choix d'orientation près) permet d'associer une forme duale $\hat{\omega}$ à toute forme non dégénérée ω :

DEFINITION 3.4 (Hitchin). 1. Si $\lambda_\theta(\omega) > 0$ et $\omega = \alpha + \beta$ alors $\hat{\omega} = \alpha - \beta$.

2. Si $\lambda_\theta(\omega) < 0$ et $\omega = \alpha + \bar{\alpha}$ alors $\hat{\omega} = i(\bar{\alpha} - \alpha)$.

Notons enfin que le produit extérieur définit une structure symplectique Θ sur $\Lambda^3(V^*)$

$$\Theta(\omega, \omega')\theta = \omega \wedge \omega',$$

pour laquelle l'action de $SL(6, \mathbb{R})$ est hamiltonienne.

PROPOSITION 3.5 (Hitchin). *L'action de $SL(6, \mathbb{R})$ sur $(\Lambda^3(V^*), \Theta)$ est hamiltonienne d'application moment $K : \Lambda^3(V^*) \rightarrow sl(6, \mathbb{R})$.*

3.2. Action de $Sp(6)$ sur $\Lambda_\varepsilon(\mathbb{R}^6)$.

Supposons maintenant que V est muni d'une forme symplectique Ω . Nous fixons la forme volume $\theta = -\frac{\Omega^3}{6}$ et nous noterons $\lambda(\omega) = \lambda_\theta(\omega)$ le pfaffien associé à une 3-forme ω . Nous dirons qu'une base $(e_1, e_2, e_3, f_1, f_2, f_3)$ est symplectique si

$$\Omega = e_1^* \wedge f_1^* + e_2^* \wedge f_2^* + e_3^* \wedge f_3^*.$$

Une 3-forme ω sur V est effective si

$$\omega \wedge \Omega = 0.$$

Nous noterons $\Lambda_\varepsilon^3(V^*)$ l'espace des 3-formes effectives sur V . $(\Lambda_\varepsilon^3(V^*), \Theta)$ est un sous espace symplectique (de dimension 14) de $(\Lambda^3(V^*), \Theta)$ puisque, d'après 2.1 toute 3-forme ω sur V peut s'écrire

$$\omega = \omega_0 + \omega_1 \wedge \Omega,$$

avec ω_0 effective.

LEMME 3.6. $\omega \in \Lambda^3(V^*)$ est effective si et seulement si $K_\omega \in sp(6)$ où $sp(6)$ est l'algèbre de Lie du groupe symplectique $Sp(6) = Sp(\Omega)$.

Démonstration. Dans une base symplectique $(e_1, e_2, e_3, f_1, f_2, f_3)$, K_ω s'écrit

$$K_\omega(X)\theta = \sum_{j=1}^3 (i_X \omega \wedge \omega \wedge e_j^*) \otimes e_j + \sum_{j=1}^3 (i_X \omega \wedge \omega \wedge f_j^*) \otimes f_j.$$

Ainsi, si on note $K_\omega = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}$, on a

$$\begin{cases} A_{jk}\theta = i_{e_j} \omega \wedge \omega \wedge e_k^* \\ B_{jk}\theta = i_{f_j} \omega \wedge \omega \wedge e_k^* \\ C_{jk}\theta = i_{e_j} \omega \wedge \omega \wedge f_k^* \\ D_{jk}\theta = i_{f_j} \omega \wedge \omega \wedge f_k^* \end{cases}$$

Or ω est effective si et seulement si les relations suivantes sont vérifiées pour $k = 1, 2, 3$,

$$\begin{cases} i_{e_k} \omega \wedge \Omega = \omega \wedge i_{e_k} \Omega = \omega \wedge f_k^* \\ i_{f_k} \omega \wedge \Omega = \omega \wedge i_{f_k} \Omega = -\omega \wedge e_k^* \end{cases}$$

et donc ω est effective si et seulement si $D = -A^t$, $B^t = B$ et $C^t = C$ i.e. si et seulement si $K_\omega \in sp(6)$. $\square$

COROLLAIRE 3.7. *L'action de $Sp(6)$ sur $(\Lambda_\varepsilon^3(V^*), \Theta)$ est hamiltonienne d'application moment $K : \Lambda_\varepsilon^3(V^*) \rightarrow sp(6)$.*

Dans [LR2] Lychagin et Roubtsov ont associé à chaque forme effective $\omega \in \Lambda_\varepsilon^3(V^*)$ un invariant symplectique $q_\omega \in S^2(V^*)$ défini par

$$q_\omega(X) = -\frac{1}{4} \lVert i_X \omega \rVert^2 (i_X \omega \wedge i_X \omega).$$

Cette invariant mesure en fait les racines du polynôme caractéristique de ω :

$$(i_X \omega - \xi \Omega)^3 = -\xi(\xi - \sqrt{|q_\omega(X)|})(\xi + \sqrt{|q_\omega(X)|})\Omega^3.$$

A partir de cet invariant ils ont établi une classification des différentes orbites de l'action de $Sp(6)$ sur $\Lambda_\varepsilon^3(V^*)$. Cette classification a été affinée dans [Ba] et est résumée dans le tableau 1.

	ω	q_ω	$\lambda(\omega)$
1.	$e_1^* \wedge e_2^* \wedge e_3^* + \gamma f_1^* \wedge f_2^* \wedge f_3^*, \gamma \neq 0$	$\frac{\gamma}{2}(e_1^* f_1^* + e_2^* f_2^* + e_3^* f_3^*)$	γ^4
2.	$f_1^* \wedge e_2^* \wedge e_3^* + f_2^* \wedge e_1^* \wedge e_3^* + f_3^* \wedge e_1^* \wedge e_2^* + \gamma^2 f_1^* \wedge f_2^* \wedge f_3^*, \gamma \neq 0$	$(e_1^*)^2 - (e_2^*)^2 + (e_3^*)^2 + \gamma^2((f_1^*)^2 - (f_2^*)^2 + (f_3^*)^2)$	$-4\gamma^4$
3.	$f_1^* \wedge e_2^* \wedge e_3^* - f_2^* \wedge e_1^* \wedge e_3^* + f_3^* \wedge e_1^* \wedge e_2^* - \gamma^2 f_1^* \wedge f_2^* \wedge f_3^*, \gamma \neq 0$	$-(e_1^*)^2 - (e_2^*)^2 - (e_3^*)^2 + \gamma^2(-(f_1^*)^2 - (f_2^*)^2 - (f_3^*)^2)$	$-4\gamma^4$
4.	$f_1^* \wedge e_2^* \wedge e_3^* + f_2^* \wedge e_1^* \wedge e_3^* + f_3^* \wedge e_1^* \wedge e_2^*$	$(e_1^*)^2 - (e_2^*)^2 + (e_3^*)^2$	0
5.	$f_1^* \wedge e_2^* \wedge e_3^* - f_2^* \wedge e_1^* \wedge e_3^* + f_3^* \wedge e_1^* \wedge e_2^*$	$-(e_1^*)^2 - (e_2^*)^2 - (e_3^*)^2$	0
6.	$f_3^* \wedge e_1^* \wedge e_2^* + f_2^* \wedge e_1^* \wedge e_3^*$	$(e_1^*)^2$	0
7.	$f_3^* \wedge e_1^* \wedge e_2^* - f_2^* \wedge e_1^* \wedge e_3^*$	$-(e_1^*)^2$	0
8.	$e_1^* \wedge e_2^* \wedge e_3^*$	0	0
9.	0	0	0

TAB. 1. Classification des 3-formes effectives en dimension 6

Les invariants q_ω et K_ω se déduisent en fait l'un de l'autre, via la forme symplectique Ω .

PROPOSITION 3.8. *Soit $\omega \in \Lambda_\varepsilon^3(V^*)$. Pour tout $X, Y \in V$ on a*

$$\Omega(K_\omega X, Y) = q_\omega(X, Y).$$

Démonstration. Un calcul direct nous permet de vérifier que le résultat est vrai pour chacune des formes du tableau 1. De plus pour tout symplectomorphisme F sur V on a

$$\begin{cases} q_{F^*\omega} = F^t q_\omega F \\ K_{F^*\omega} = F^{-1} K_\omega F \end{cases}$$

Le résultat est donc vrai pour toute forme. $\square$

REMARQUE 3.9. *Puisque $dq_\omega = q_\omega$, 3.8 s'énonce*

$$K_\omega = X_{q_\omega},$$

i.e. K_ω est le champ hamiltonien associé à l'hamiltonien q_ω . Autrement dit modulo l'identification des algèbres de Lie $(sp(6), [\cdot, \cdot])$ et $(S^2(6), \{\cdot, \cdot\})$ (où $\{\cdot, \cdot\}$ est le crochet de Poisson sur V associé à Ω), q_ω est l'application moment associée à l'action hamiltonienne de $Sp(6)$. Les différentes orbites de cette action sont les différents niveaux de moment à conjugaison près.

4. STRUCTURES DE MONGE-AMPÈRE NON DÉGÉNÉRÉES ET STRUCTURES GÉOMÉTRIQUES ASSOCIÉES.

DEFINITION 4.1. *Une structure de Monge-Ampère (Ω, ω_0) sur une variété X^6 de dimension 6 est dite*

1. *elliptique si $\lambda(\omega_0) < 0$,*
2. *hyperbolique si $\lambda(\omega_0) > 0$.*

DEFINITION 4.2. Une structure de Monge-Ampère (Ω, ω_0) sur une variété X^6 de dimension 6 est dite fermée si la forme normalisée

$$\omega = \frac{\omega_0}{\sqrt[4]{|\lambda(\omega_0)|}}.$$

vérifie

$$d\omega = d\hat{\omega} = 0$$

4.1. Structures elliptiques.

DEFINITION 4.3. Une structure presque (pseudo) Calabi-Yau sur une variété réelle X^6 est la donnée

1. d'une structure presque (pseudo) Kähler (q, I, Ω) sur X : Ω est une 2-forme non dégénérée et fermée, I est une structure presque complexe telle $I^*\Omega = \Omega$ et q est la métrique (éventuellement indéfinie) $q = \Omega(I., .)$;
2. d'une forme différentielle complexe α de type $(3, 0)$ sur X telle que

$$\Omega^3 = -\frac{3i}{4}\alpha \wedge \bar{\alpha}.$$

Une structure presque (pseudo) Calabi-Yau (q, I, Ω, α) est une structure (pseudo) Calabi-Yau si la structure presque complexe I est intégrable et si la forme α est holomorphe pour cette structure complexe.

DEFINITION 4.4. Soit (Ω, ω_0) une structure de Monge-Ampère elliptique sur une variété X de dimension 6. Soit ω la forme normalisée

$$\omega = \frac{\omega_0}{\sqrt[4]{|\lambda(\omega_0)|}}.$$

La structure presque (pseudo) Calabi-Yau associée à la classe conforme (Ω, ω_0) est $(q_\omega, K_\omega, \Omega, \alpha)$ avec

$$\alpha = \frac{4}{3}(\omega + iK_\omega^*(\omega)).$$

EXEMPLE 4.5. La structure géométrique sur $T^*\mathbb{R}^3$ associée à l'équation spéciale lagrangienne

$$\text{hess}(f) - \Delta f = 0$$

est la structure de Calabi-Yau classique (q, I, Ω, α) avec :

$$\begin{cases} q = -\sum_{j=1}^3 dx_j \cdot dx_j + dy_j \cdot dy_j \\ I = \sum_{j=1}^3 \frac{\partial}{\partial y_j} \otimes dx_j - \frac{\partial}{\partial x_j} \otimes dy_j \\ \Omega = \sum_{j=1}^3 dx_j \wedge dy_j \\ \alpha = dz_1 \wedge dz_2 \wedge dz_3 \end{cases}$$

De manière similaire, la structure géométrique associée à l'équation pseudo spéciale lagrangienne

$$\text{hess}(f) + \square f = 0$$

est la structure pseudo Calabi-Yau $(q_-, I_-, \Omega, \alpha)$ avec :

$$\begin{cases} q_- = dx_1 \cdot dx_1 - dx_2 \cdot dx_2 + dx_3 \cdot dx_3 + dy_1 \cdot dy_1 - dy_2 \cdot dy_2 + dx_3 \cdot dx_3 \\ I_- = -\frac{\partial}{\partial y_1} \otimes dx_1 + \frac{\partial}{\partial x_1} \otimes dy_1 + \frac{\partial}{\partial y_2} \otimes dx_2 - \frac{\partial}{\partial x_2} \otimes dy_2 - \frac{\partial}{\partial y_3} \otimes dx_3 + \frac{\partial}{\partial x_3} \otimes dy_3 \\ \Omega = \sum_{j=1}^3 dx_j \wedge dy_j \\ \alpha = dz_1 \wedge dz_2 \wedge dz_3 \end{cases}$$

Ces deux structures sont les seuls exemples associés à des équations de Monge-Ampère elliptiques à coefficients constants, puisque, d'après le tableau 1, il n'y a que deux telles équations sur $\mathbb{R}^6$.

Remarquons qu'à toute structure presque Calabi-Yau (q, I, Ω, α) est associée la structure elliptique $(\Omega, \text{Re}(\alpha))$. Il y a ainsi une correspondance entre les structures presque (pseudo) Calabi-Yau et les classes conformes de structures de Monge-Ampère elliptiques.

PROPOSITION 4.6. *La structure presque Calabi-Yau associée à une structure de Monge-Ampère elliptique est une structure de Calabi-Yau si et seulement si celle-ci est fermée au sens de la définition 4.2.*

Démonstration. Soit (Ω, ω) une structure de Monge-Ampère telle que $\lambda(\omega) = 1$. Soit $I = K_\omega$ la structure presque complexe associée et $\alpha = \frac{1}{2}(\omega + iI^*\omega)$ la forme complexe de type $(n, 0)$ associée.

Si $(q_\omega, I, \Omega, \alpha)$ est une structure de Calabi-Yau alors α est holomorphe donc $d\alpha = 0$ et de la même façon, $d\bar{\alpha} = 0$. Donc $d\omega = d\hat{\omega} = 0$.

Réciproquement supposons que $d\omega = d\hat{\omega} = 0$. Alors $d\alpha = d\hat{\alpha} = 0$. Soit sur $TX \otimes \mathbb{C}$ la distribution $C : x \mapsto \{X : i_X \alpha_x = 0\}$. Une 1-forme ξ s'annule sur C si et seulement $\xi \wedge \alpha = 0$ et donc si ξ s'annule sur C alors $d\xi \wedge \alpha = 0$. D'après le théorème de Frobenius, la distribution C est intégrable et donc, d'après le théorème de Newlander-Nirenberg, I est intégrable. $\square$

4.2. Structures hyperboliques.

Par analogie avec le cas elliptique, le cas hyperbolique est associé à une structure réelle (ou produit) qui est l'analogue des structures de Calabi-Yau. Ceci nous conduit à poser la définition suivante.

DEFINITION 4.7. *Une structure presque pseudo Calabi-Yau réelle sur une variété réelle de dimension 6 est la donnée*

1. d'une structure pseudo Kähler hyperbolique (q, S, Ω) : Ω est une 2-forme non dégénérée et fermée, S est une structure presque produit ($S^2 = \text{Id}$) telle que $S^*\Omega = -\Omega$ et $q = \Omega(S, \cdot)$ est une métrique de signature $(3, 3)$;
2. de deux formes décomposables α et β dont les distributions associées sont les distributions des vecteurs propres de S et telles que

$$\alpha \wedge \beta = -\frac{\Omega^3}{6}$$

Une structure presque pseudo Calabi-Yau réelle est une structure pseudo Calabi-Yau réelle si S est intégrable et si α et β sont fermées.

REMARQUE 4.8. *Ces variétés sont l'analogue des "variétés de Monge-Ampère" au sens de Kontsevich et Soibelman ([KS]). Une variété de Monge-Ampère est pour*

eux une variété riemannienne affine (M, g) telle que localement la métrique s'écrit

$$g = \sum_{i,j} \frac{\partial^2 K}{\partial x_i \partial x_j} dx_i \cdot dx_j,$$

où K est une fonction lisse vérifiant

$$\det\left(\frac{\partial^2 K}{\partial x_i \partial x_j}\right) = \text{constant}.$$

Comme on le verra plus loin, dans le cas des variétés de Calabi-Yau réelles, on a un tel potentiel K et la métrique s'écrit

$$g = \sum_{i,j} \frac{\partial^2 K}{\partial x_i \partial y_j} dx_i \cdot dy_j.$$

avec

$$\det\left(\frac{\partial^2 K}{\partial x_i \partial y_j}\right) = \text{constant}.$$

DEFINITION 4.9. Soit (Ω, ω_0) une structure de Monge-Ampère hyperbolique sur une variété X de dimension 6. Soit ω la forme normalisée

$$\omega = \frac{\omega_0}{\sqrt[4]{\lambda(\omega_0)}}.$$

La structure presque pseudo Calabi-Yau associée à la classe conforme (Ω, ω_0) est $(q_\omega, K_\omega, \Omega, \alpha, \beta)$ avec

$$\alpha = \frac{1}{2}(\omega + K_\omega^*(\omega))$$

et

$$\beta = \frac{1}{2}(\omega - K_\omega^*(\omega)).$$

EXEMPLE 4.10. La structure (pseudo) Calabi-Yau réelle associée à l'équation de Monge-Ampère classique

$$\text{hess}(f) = 1$$

est la structure $(q, S, \Omega, \alpha, \beta)$ avec :

$$\begin{cases} q = \sum_{j=1}^3 dx_j \cdot dy_j \\ S = \sum_{j=1}^3 \frac{\partial}{\partial x_j} \otimes dx_j - \frac{\partial}{\partial y_j} \otimes dy_j \\ \Omega = \sum_{j=1}^3 dx_j \wedge dy_j \\ \alpha = dx_1 \wedge dx_2 \wedge dx_3, \beta = dy_1 \wedge dy_2 \wedge dy_3 \end{cases}$$

De façon tout à fait similaire au cas elliptique on a la proposition

PROPOSITION 4.11. La structure presque pseudo Calabi-Yau réelle associée à une structure de Monge-Ampère hyperbolique est une structure pseudo Calabi-Yau réelle si et seulement si celle-ci est fermée au sens de la définition 4.2.

4.3. Structures de Monge-Ampère non dégénérées localement constantes sur $\mathbb{R}^6$.

DEFINITION 4.12. Une structure de Monge-Ampère (Ω, ω) sur une variété X est dite localement constante si au voisinage de tout point il existe un système de coordonnées de Darboux de (X, Ω) dans lequel ω est à coefficients constants

D'après 1, une structure de Monge-Ampère non dégénérée localement constante est associée à une équation différentielle qui modulo un changement de variable symplectique a l'une des trois formes suivantes :

$$\begin{cases} \text{hess}(f) = \gamma, & \gamma \neq 0 \\ \Delta f - \gamma \text{hess}(f) = 0, & \gamma \neq 0 \\ \square f + \gamma \text{hess}(f) = 0, & \gamma \neq 0 \end{cases}$$

THEOREME 4.13. Soit (Ω, ω_0) une structure de Monge-Ampère locale non dégénérée sur une variété réelle de dimension 6 N^6 . Soit la forme normalisée associée à ω_0

$$\omega = \frac{\omega_0}{\sqrt[4]{|\lambda(\omega_0)|}}.$$

(Ω, ω) est localement constante si et seulement si

$$\begin{cases} d\omega = d\hat{\omega} = 0 \\ R(q_\omega) = 0 \end{cases}$$

où $R(q_\omega)$ est le tenseur de courbure de la (pseudo) métrique q_ω associé à ω .

Démonstration. Cas hyperbolique : $\lambda(\omega) = 1$

Si $\omega = du_1 \wedge du_2 \wedge du_3 + dv_1 \wedge dv_2 \wedge dv_3$ dans un système de coordonnées symplectique (u, v) alors $\hat{\omega} = du_1 \wedge du_2 \wedge du_3 - dv_1 \wedge dv_2 \wedge dv_3$. Donc $d\omega = d\hat{\omega} = 0$. De plus :

$$\begin{cases} K_\omega(\frac{\partial}{\partial u_j}) = \frac{\partial}{\partial u_j} & j = 1, 2, 3 \\ K_\omega(\frac{\partial}{\partial v_j}) = -\frac{\partial}{\partial v_j} & j = 1, 2, 3 \end{cases}$$

et donc $q_\omega = \sum_{j=1}^3 du_j \cdot dv_j : q_\omega$ est plate.

Réciproquement supposons que $d\omega = d\hat{\omega} = 0$ et $R(q_\omega) = 0$. Le problème étant local on peut supposer que l'on se trouve au voisinage de $a_0 = (0, 0)$ dans $N = \mathbb{R}^6$. Soit α et β les uniques formes décomposables telles que

$$\begin{cases} \omega = \alpha + \beta \\ \hat{\omega} = \alpha - \beta \\ \alpha \wedge \beta = -\frac{1}{6}\Omega^3 \end{cases}$$

Puisque ω et $\hat{\omega}$ sont fermées, $S = K_\omega$ est intégrable et α et β sont fermées. Il existe alors un système de coordonnées (x, y) de N dans lequel

$$\begin{cases} \omega = f(x, y)dx_1 \wedge dx_2 \wedge dx_3 + dy_1 \wedge dy_2 \wedge dy_3 \\ \hat{\omega} = g(x, y)dx_1 \wedge dx_2 \wedge dx_3 - dy_1 \wedge dy_2 \wedge dy_3 \end{cases}$$

Mais α et β sont fermées et $\alpha \wedge \beta$ est constante donc f et g sont des constantes que l'on peut supposer égales à 1. K_ω s'écrit alors :

$$\begin{cases} K_\omega(\frac{\partial}{\partial x_i}) = \frac{\partial}{\partial x_i} \\ K_\omega(\frac{\partial}{\partial y_i}) = -\frac{\partial}{\partial y_i} \end{cases}$$

La forme ω est effective et en tout point a , $\hat{\omega}_a = K_{\omega_a}^* \omega_a$ donc $\hat{\omega}$ est effective puisque en tout point a $K_{\omega_a}^* \Omega_a = -\Omega_a$. Dès lors α et β sont effectives. Autrement dit en tout point a , $E_\alpha(a) = \text{Ker}(\alpha_a)$ et $E_\beta(a) = \text{Ker}(\beta_a)$ sont deux sous espaces lagrangiens de $(T_a N, \Omega_a)$. En effet si X et $Y \in E_\alpha(a)$ par exemple :

$$0 = i_{X \wedge Y}(\Omega \wedge \alpha) = \Omega(X, Y)\alpha$$

Dès lors :

$$\Omega = \sum_{i,j=1}^3 a_{ij} dx_i \wedge dy_j$$

Or Ω est fermée. Donc

$$\begin{cases} \frac{\partial a_{ij}}{\partial x_k} = \frac{\partial a_{kj}}{\partial x_i} \\ \frac{\partial a_{ij}}{\partial y_k} = \frac{\partial a_{ik}}{\partial y_j} \end{cases}$$

Définissons pour $j = 1, 2, 3$ les fonctions

$$\phi_j(x, y) = \int_0^{x_1} a_{1j}(t, x_2, x_3, y) dt + \int_0^{x_2} a_{2j}(0, t, x_3, y) dt + \int_0^{x_3} a_{3j}(0, 0, t, y) dt$$

Pour $i = 1, 2, 3$ on a $\frac{\partial \phi_j}{\partial x_i} = a_{ij}$. De plus :

$$\frac{\partial \phi_j}{\partial y_k} = \frac{\partial \phi_k}{\partial y_j}$$

donc il existe une fonction lisse ϕ sur $\mathbb{R}^6$ telle que $\phi_j = \frac{\partial \phi}{\partial y_j}$ et $a_{ij} = \frac{\partial^2 \phi}{\partial x_i \partial y_j}$. Finalement :

$$\begin{cases} \Omega = \sum_{i,j} \frac{\partial^2 \phi}{\partial x_i \partial y_j} dx_i \wedge dy_j \\ q_\omega = \sum_{i,j} \frac{\partial^2 \phi}{\partial x_i \partial y_j} dx_i \cdot dy_j \end{cases}$$

Utilisons maintenant le fait que q_ω est plate. Soit Γ_{jk}^j les symboles de Christoffels de la connexion de Levi-Civita $\nabla = \nabla_\omega$ dans les coordonnées (x, y) . Soit pour $j = 1 \dots 6$ la matrice

$$\Gamma_j = (\Gamma_{jk}^l)_{j,k=1}^6$$

On vérifie facilement que pour $j = 1, 2, 3$:

$$\begin{cases} \Gamma_j = \begin{pmatrix} \frac{\partial A}{\partial x_j} A^{-1} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \\ \Gamma_{j+3} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & (A^{-1} \frac{\partial A}{\partial y_j})^t \end{pmatrix} \end{cases}$$

avec $A_{jk} = \frac{\partial^2 \phi}{\partial x_j \partial y_k}$.

Posons $C_j = \frac{\partial A}{\partial x_j} A^{-1}$ et $D_j = A^{-1} \frac{\partial A}{\partial y_j}$ pour $j = 1, 2, 3$. De $R = 0$ il vient pour $j, k = 1, 2, 3$:

$$\begin{cases} \frac{\partial C_j}{\partial y_k} = 0 \\ \frac{\partial C_j}{\partial x_k} - \frac{\partial C_k}{\partial x_j} + [C_j, C_k] = 0 \end{cases}$$

et

$$\begin{cases} \frac{\partial D_j}{\partial x_i} = 0 \\ \frac{\partial D_i}{\partial y_j} - \frac{\partial D_j}{\partial y_i} + [D_i, D_j] = 0 \end{cases}$$

Soit $G = G(x)$ une solution du système différentiel

$$\frac{\partial G}{\partial x_j} G^{-1} = C_j, \quad j = 1, 2, 3$$

(une telle solution existe toujours, c.f. lemme 5.1). On a alors pour $j = 1, 2, 3$:

$$\begin{aligned} \frac{\partial A^{-1}G}{\partial x_j} &= \frac{\partial A^{-1}}{\partial x_j}G + A^{-1}\frac{\partial G}{\partial x_j} \\ &= -A^{-1}\frac{\partial A}{\partial x_j}A^{-1}G + A^{-1}\frac{\partial G}{\partial x_j} \\ &= -A^{-1}C_jG + A^{-1}C_jG \\ &= 0 \end{aligned}$$

et donc :

$$A(x, y) = G(x)F(y)$$

Notons $G_j(x) = (G_{j1}(x), G_{j2}(x), G_{j3}(x))$ et $F_j(y) = (F_{1j}(y), F_{2j}(y), F_{3j}(y))$ pour $j = 1, 2, 3$. De $\frac{\partial^3 \phi}{\partial x_j \partial x_k \partial y_l} = \frac{\partial^3 \phi}{\partial x_k \partial x_j \partial y_l}$ il vient

$$\langle \frac{\partial G_j}{\partial x_k} - \frac{\partial G_k}{\partial x_j}, F_l \rangle = 0$$

et donc $\frac{\partial G_j}{\partial x_k} = \frac{\partial G_k}{\partial x_j}$: il existe des fonctions $u_1(x), u_2(x), u_3(x)$ telles que

$$G_j = (\frac{\partial u_j}{\partial x_1}, \frac{\partial u_j}{\partial x_2}, \frac{\partial u_j}{\partial x_3})$$

et de la même façon il existe des fonctions $v_1(y), v_2(y), v_3(y)$ telles que

$$F_j = (\frac{\partial v_j}{\partial y_1}, \frac{\partial v_j}{\partial y_2}, \frac{\partial v_j}{\partial y_3})$$

Dès lors dans le système de coordonnées (u, v) on a

$$\begin{cases} \Omega = du_1 \wedge dv_1 + du_2 \wedge dv_2 + du_3 \wedge dv_3 \\ \omega = r(u)du_1 \wedge du_2 \wedge du_3 + s(v)dv_1 \wedge dv_2 \wedge dv_3 \end{cases}$$

Mais $\omega \wedge \hat{\omega} = -\frac{1}{6}\Omega^3$ donc r et s sont constantes et inverses l'une de l'autre. Quitte à remplacer u_1 par ru_1 et v_1 par $\frac{1}{r}v_1$ on obtient le résultat souhaité.

Cas elliptique défini négatif : $\lambda = 1$, $s(q_\omega) = (0, 6)$

La démonstration est analogue à la précédente en remplaçant les coordonnées réelles (x, y) par les coordonnées complexes $(z, \bar{z})$:

Si

$$\begin{cases} \omega = Re(idz_1 \wedge dz_2 \wedge dz_3) \\ \Omega = \frac{i}{2}(dz_1 \wedge \bar{dz}_1 + dz_2 \wedge \bar{dz}_2 + dz_3 \wedge \bar{dz}_3) \end{cases}$$

alors $d\omega = d\hat{\omega} = 0$ et $q_\omega = \sum_{j=1}^3 dz_j \cdot \bar{dz}_j$ est plate.

Réciproquement supposons que $d\omega = d\hat{\omega} = 0$ et $R(q_\omega) = 0$. Comme précédemment le fait que $\omega = \alpha + \bar{\alpha}$ et $\hat{\omega}$ soient fermées implique que la structure complexe K_ω est intégrable. Il existe un système de coordonnées (z_1, z_2, z_3) de N dans laquelle $\alpha = idz_1 \wedge dz_2 \wedge dz_3$. De plus $(q_\omega, K_\omega, \Omega)$ est une structure de Kähler donc il existe un potentiel de Kähler ϕ tel que

$$\Omega = i\partial\bar{\partial}\phi = i \sum_{j,k=1}^3 \frac{\partial^2 \phi}{\partial z_j \partial \bar{z}_k} dz_j \wedge \bar{dz}_k$$

De $R(q_\omega) = 0$ on déduit que la matrice $A = (\frac{\partial^2 \phi}{\partial z_j \partial \bar{z}_k})$ s'écrit nécessairement

$$A(z, \bar{z}) = G(z)F(\bar{z})$$

Mais $\bar{A}^t = A$ donc $\bar{F}^t = GF(\bar{G}^t)^{-1}$. Or $\bar{F}$ et G sont holomorphes et $F(\bar{G}^t)^{-1}$ est antiholomorphe donc constante :

$$A(z, \bar{z}) = H(z)\bar{H}^t(\bar{z})$$

et donc nécessairement il existe des fonctions holomorphes $u_1(z), u_2(z), u_3(z)$ telles que

$$\frac{\partial^2 \phi}{\partial z_j \partial \bar{z}_k} = \sum_{l=1}^3 \frac{\partial u_l}{\partial z_j} \cdot \frac{\partial \bar{u}_l}{\partial \bar{z}_k}$$

Dès lors dans le système de coordonnées complexes (u_1, u_2, u_3) on a le résultat voulu.

Cas elliptique indéfini : $\lambda(\omega) = 1$, $s(q_\omega) = (4, 2)$

On remarque que la structure de Monge-Ampère pseudo-Kähler se déduit de la structure de Monge-Ampère Kähler par le changement de variable $\xi : z_2 \mapsto \bar{z}_2$. (Ω, ω) est alors localement constante si et seulement si $(\xi^* \Omega, \xi^* \omega)$ est localement constante. $\square$

Nous pouvons résumer la correspondance entre structures (pseudo) Calabi-Yau et classes conformes de structures de Monge-Ampère elliptiques dans le tableau 2 :

presque (pseudo) CY	MA elliptique
(pseudo) CY	MA elliptique fermé
(pseudo) CY plat	MA elliptique localement constant

TAB. 2. Correspondance entre structures de Calabi-Yau et structures de Monge-Ampère elliptiques

EXEMPLE 4.14. *Il existe peu d'exemples explicites de structures de Calabi-Yau. Le premier exemple non trivial est l'exemple des métriques de Stenzel sur T^*S^n ([St]) comme l'explique Michèle Audin dans son cours Lagrangian submanifold ([A]). C'est un exemple de structure de Calabi-Yau non plate, aussi l'équation spéciale lagrangienne associée n'est pas l'équation spéciale lagrangienne classique.*

$T^*S^n = \{(u, v) \in \mathbb{R}^{n+1} \times \mathbb{R}^{n+1} : \|u\| = 1, \langle u, v \rangle = 0\}$ s'identifie à la quadrique affine complexe $Q^n = \{z \in \mathbb{C}^{n+1} : z_1^2 + \dots + z_{n+1}^2 = 1\}$ via l'isomorphisme

$$\xi(x + iy) = \left(\frac{x}{\sqrt{1 + \|y\|^2}}, y \right)$$

La forme holomorphe sur Q^n peut être définie par :

$$\alpha_z(Z_1, \dots, Z_n) = \det_{\mathbb{C}}(z, Z_1, \dots, Z_n)$$

Ainsi par exemple dans l'ouvert de carte $z_{n+1} \neq 0$,

$$\alpha = \frac{(-1)^n}{z_{n+1}} dz_1 \wedge \dots \wedge dz_n$$

La forme de Kähler $\Omega = i\partial\bar{\partial}\phi$ est définie à partir du potentiel de Kähler $\phi = f(\tau)$ où τ est la restriction à Q^n de $|z_1|^2 + \dots + |z_n^2|$ et f est solution de l'équation différentielle ordinaire

$$x(f')^n + f''(f')^{n-1}(x^2 - 1) = c > 0$$

Intéressons nous au cas $n = 3$. Pour associer à une structure de Monge-Ampère une équation “explicite” il faut déterminer tout d’abord un système de coordonnées de Darboux. Remarquons pour cela que

$$\Omega = -d\text{Im}\bar{\partial}\phi = d\{f'(\tau)\sum_{k=1}^4 x_k dy_k - y_k dx_k\} = -2d\{f'(\tau)\sum_{k=1}^4 y_k dx_k\},$$

puisque sur Q^3 , $\sum x_k dy_k + \sum y_k dx_k = 0$. Dès lors dans les coordonnées (u, v) de T^*S^3 on a :

$$\Omega = -2d\{f'(2 + 2\|v\|^2)\sqrt{1 + \|v\|^2}\sum_{k=1}^4 v_k du_k\}.$$

De plus sur l’ouvert de carte $u_4 \neq 0$, $du_4 = -\frac{1}{u_4}\sum_{k=1}^3 u_k du_k$ et donc $\Omega = \sum_{k=1}^3 dw_k \wedge du_k$ avec

$$w_k = 2 \frac{f'(2 + 2\|v\|^2)\sqrt{1 + \|v\|^2}}{u_4} (u_k v_4 - v_k u_4).$$

Notons ψ l’application $(u, w) \mapsto (x + iy)$. L’équation spéciale lagrangienne de Stenzel peut s’écrire

$$(\psi \circ df)^* \omega = 0.$$

5. ANNEXE

LEMME 5.1. Soit C_1, C_2, C_3 des matrices carrées à coefficients lisses au voisinage de 0 sur $\mathbb{R}^3$ telles que

$$\frac{\partial C_i}{\partial x_j} - \frac{\partial C_j}{\partial x_i} + [C_i, C_j] = 0$$

Alors il existe toujours une solution $G = G(x_1, x_2, x_3)$ solution du système différentiel

$$\begin{cases} \frac{\partial G}{\partial x_1} G^{-1} = C_1 \\ \frac{\partial G}{\partial x_2} G^{-1} = C_2 \\ \frac{\partial G}{\partial x_3} G^{-1} = C_3 \end{cases}$$

Démonstration. Soit $X(x_1, x_2, x_3)$ l’unique solution de

$$(6) \quad \frac{\partial G}{\partial x_1} G^{-1} = C_1$$

avec $X(0, x_2, x_3) = Id$. Pour n’importe quelle matrice $Y(x_2, x_3)$, XY est encore solution de (6). Nous allons montrer que l’on peut choisir $Y(x_2, x_3)$ telle que XY soit solution du système.

XY est solution du système si et seulement si

$$(7) \quad \begin{cases} \frac{\partial Y}{\partial x_2} Y^{-1} = X^{-1}(C_2 X - \frac{\partial X}{\partial x_2}) \\ \frac{\partial Y}{\partial x_3} Y^{-1} = X^{-1}(C_3 X - \frac{\partial X}{\partial x_3}) \end{cases}$$

Posons $C'_2 = X^{-1}(C_2 X - \frac{\partial X}{\partial x_2})$ et $C'_3 = X^{-1}(C_3 X - \frac{\partial X}{\partial x_3})$. On vérifie sans peine que

$$\begin{cases} \frac{\partial C'_2}{\partial x_1} = 0 \\ \frac{\partial C'_3}{\partial x_1} = 0 \\ \frac{\partial C'_2}{\partial x_3} - \frac{\partial C'_3}{\partial x_2} + [C'_2, C'_3] = 0 \end{cases}$$

Soit alors $\tilde{Y}(x_2, x_3)$ l’unique solution de

$$(8) \quad \frac{\partial \tilde{Y}}{\partial x_2} \tilde{Y}^{-1} = C'_2$$

telle que $\tilde{Y}(0, x_3) = Id$. $\tilde{Y}(x_2, x_3)Z(x_3)$ est solution de (7) si et seulement si $Z(x_3)$ est solution de

$$(9) \quad \frac{\partial Z}{\partial x_3} Z^{-1} = C''_3$$

avec $C''_3 = \tilde{Y}^{-1}(C'_3 \tilde{Y} - \frac{\partial \tilde{Y}}{\partial x_3})$. Or on vérifie que

$$\frac{\partial C''_3}{\partial x_2} = 0$$

Donc il existe un unique $Z(x_3)$ solution de (9) tel que $Z(0) = Id$. Une solution du système initial est alors :

$$G(x_1, x_2, x_3) = X(x_1, x_2, x_3) \tilde{Y}(x_2, x_3) Z(x_3)$$

□

RÉFÉRENCES

- [A] Audin (M.) : *Lagrangian Submanifold* <http://irmasrv1.u-strasbg.fr/~maudin/publications.html>
- [Ba] Banos (B.) : *On symplectic classification of effective 3 forms and Monge-Ampère equations*, soumis
- [CS] Chynoweth (S.), Sewell (M.J.) : *Dual variables in semi-geostrophic theory*, Proc. R. Soc. Lond., A 424, p. 155-186, 1989
- [HL] Harvey (R.), Lawson (H.B.) : *Calibrated geometries*, Acta. Math. 148, p. 47-157
- [Hi] Hitchin (N.) : *The geometry of three-forms in six and seven dimensions*, Journal of Differential Geometry, 56, 2001
- [KS] Kontsevich (M.), Soibelman (Y.) : *Homological mirror symmetry and torus fibrations*, Proceedings of KIAS conference in Symplectic geometry and Strings, 2001
- [L] Lychagin (V.V.) : *Non linear differential equations and contact geometry*, Uspèkhi Mat. Nauk, vol 34, 1979, p.137-165 (in Russian); english transl. in Russian Math. Surveys, vol 34, 1979
- [LR1] Lychagin (V.V.), Roubtsov (V.) : *On Sophus Lie Theorems for Monge-Ampère equations*, Doklady Bielorrussian Academy of Science, vol. 27, 5, 1983, p. 396-398 (in Russian)
- [LR2] Lychagin (V.V.), Roubtsov (V.N.) : *Local classifications of Monge-Ampère equations*, Soviet. Math. Dokl, vol 28,2, 1983, p 396-398
- [LR3] Lychagin (V.V.), Roubtsov (V.N.) and Chekalov (I.V.) : *A classification of Monge-Ampère equations*, Ann. scient. Ec. Norm. Sup, 4 ème série, t.26, 1993, p.281-308
- [St] Stenzel (M.) *Ricci-flat metrics on the complexification of a compact rank one symmetric space*, Manuscripta. Math. 80, 1993, p. 151-163
- [SYZ] Strominger (A.), Yau (S.T) et Zaslow (E.) : *Mirror symmetry is T-duality*, Nuclear Phys., B 479, 1996, p. 243-259

BERTRAND BANOS, DÉPARTEMENT DE MATHÉMATIQUES, UNIVERSITÉ D'ANGERS, 2 BD LAVOISIER, 49045 ANGERS, FRANCE

E-mail address: bertrand.banos@univ-angers.fr